



Clinique Vétérinaire  
De La Pointe

**CLINIQUE VETERINAIRE DE LA POINTE**

**Dr PELISSIER Magali**

**Dr PELISSIER Isabelle**

**Dr PELLEGRIN Christine**

364 route de Lavour, 81370 SAINT-SULPICE

Tel : 05.63.41.95.38

Mail : clinvetlapointe@gmail.com

Consultation sur **RENDEZ-VOUS** du lundi au vendredi 9h-12h/14h-19h, le samedi 9h-12h



... Pour un bon départ dans la vie...

... Voici quelques conseils...

Vous venez d'acquérir un chiot.

Voici un guide élaboré par l'équipe de la clinique, pour vous aider à vivre en parfaite harmonie avec votre compagnon, tout en lui assurant une bonne santé tout au long des nombreuses années à venir.

### **PREAMBULE :**

En adoptant un chien, vous vous engagez à l'éduquer et à en être responsable pour la durée de sa vie, soit environ 15 ans !

Quelques règles d'éducation vous permettront de vivre sereinement avec votre animal, dans un respect mutuel.

Tout d'abord, première règle très générale, **TOUT CE QUE VOUS PERMETTEZ À VOTRE CHIOT, IL LE REPRODUIRA, ET TOUTE (mauvaise) HABITUDE PRISE SERA TRÈS DIFFICILE À FAIRE CESSER.**

A titre d'exemple, si vous acceptez que votre chiot (pesant actuellement 6 kg à 2 mois, mais qui en fera 30-35 à l'âge adulte) grimpe sur le canapé, il sera très difficile de lui en interdire l'accès par la suite (vous savez, lorsque vous rentrerez d'une promenade hivernale en forêt dans la boue, et qu'il sera tout plein de terre !!) ... ou encore, si vous tolérez "juste une fois parce que c'est le WE et que papi et mamie sont venus déjeuner" qu'on lui donne un morceau de saucisson ou des croûtes de fromage à table, il sera très très difficile par la suite de l'empêcher de venir quémander à table (ce qui peut être incommode lorsqu'une de vos convives porte un joli pantalon blanc et que votre chien boxer débordant d'affection a une fâcheuse tendance à baver... justement sur ledit pantalon blanc... )... Bref, tout ce que vous lui autorisez "juste une fois", est très vite appris par le chiot, et il sera très difficile de se débarrasser d'une mauvaise habitude.

Autre chose : vous allez vite vous rendre compte que votre chiot a une fâcheuse tendance **À VOUS SOLLICITER TRÈS SOUVENT**. Il vous demande à manger quand l'heure du repas approche, il vient vous réclamer des caresses, il vous apporte la balle pour que vous jouiez avec lui, il vient vous quémander à table si vous avez eu le malheur de l'habituer à lui distribuer pendant vos repas des petites friandises (croûtes de fromage etc...). Il n'est absolument pas

défendu de jouer avec lui, de lui donner des friandises, de lui donner des caresses **MAIS TOUS CES GESTES DOIVENT ÊTRE FAITS A VOTRE INITIATIVE** : par exemple, lorsque vous rentrez et que votre chien vous sollicite pour des caresses ou un jeu, il est conseillé d'abord de l'envoyer à sa place (son panier, son tapis etc...), de le laisser se calmer **ET ENSUITE D'ALLER LE CHERCHER** pour le caresser, aller jouer avec lui..... Ainsi, c'est **VOUS QUI DECIDEZ** du moment où on joue, on câline, on donne une friandise....

Pour revenir sur l'exemple des petits restes de table : il n'est absolument pas interdit, **DE TEMPS EN TEMPS**, de lui donner quelques restes de viande, croûtes de fromage ou autre (à condition que ça ne soit pas des aliments toxiques : cf plus bas, ou que votre chien ne présente pas de problème de santé particulier comme un surpoids ou une allergie), **MAIS NE LUI DONNEZ PAS LORSQUE LUI VIENT LE RÉCLAMER À TABLE : ATTENDEZ LA FIN DU REPAS, DÉBARRASSEZ, BUVEZ VOTRE CAFÉ TRANQUILLEMENT**, et ce n'est qu'après que vous pourrez aller lui servir ses friandises **DANS SA GAMELLE** ( mais ne le faites pas trop souvent, sinon à la fin de chaque repas votre chien attendra quelque chose, et deviendra insupportable car il quémandera de manière très insistante ! )

Une fois ces premiers points discutés, voici quelques conseils point par point :

### QUELQUES BASES GÉNÉRALES :

- Le lieu de couchage (la gestion du territoire) :

L'endroit que vous aurez choisi pour installer le couchage de votre chiot est stratégique.

Il faut que ça soit un endroit confortable (tapis rembourré, coussin... il existe de nombreux coussins étudiés exprès pour les chiens.... ([www.vetoavenue.fr](http://www.vetoavenue.fr))).

L'endroit ne doit pas être un lieu de passage pour deux raisons :

1- Il ne sera jamais tranquille car dérangé par vos allers et venues (un chiot de 2 mois à besoin de beaucoup dormir, il doit pouvoir être au calme).

2- Il risque d'adopter une position de contrôle de tout ce que vous faites, de tous vos faits et gestes, lui donner des prérogatives de dominant.

Préférez un coin un peu isolé (derrière un canapé, sous une table), d'où il ne peut pas avoir de contrôle visuel des issues.

### Ce qu'il faut faire :

Habituez votre chiot dès la première nuit à dormir dans "son" endroit.

Au départ, il cherchera à coup sûr à vous suivre partout dans la maison, et vous risquez de passer quelques nuits un peu agitées, car il risque de gémir mais tenez bon ! Il est important qu'il associe "son" endroit à un lieu de repos, de tranquillité... Pour l'habituer à s'y rendre, donnez-lui l'ordre choisi ("à ta place" ou "au tapis" ou "au panier"...), et accompagnez le et récompensez le avec une friandise dès qu'il est à sa place. Recommencez jusqu'à l'acquisition de cet ordre en toute circonstances (cela peut prendre plusieurs semaines).

### Ce qu'il faut éviter :

Prendre votre chiot dans votre chambre, dans votre lit dès les premières nuits : comme évoqué plus tôt : **TOUT CE QUE VOUS PERMETTEZ À VOTRE CHIOT, IL LE REPRODUIRA, ET TOUTE (mauvaise) HABITUDE PRISE SERA TRÈS DIFFICILE À FAIRE CESSER.** Vous risquez certaines mauvaises nuits, mais ça vaut le coup pour le long terme !

Prendre le chiot avec vous sur le canapé : chacun son lieu de repos : il existe des coussins pour chien aussi (voir plus !) confortables que votre canapé ! Et n'oubliez pas que **TOUT CE QUE VOUS PERMETTEZ À VOTRE CHIOT, IL LE REPRODUIRA, ET TOUTE (mauvaise) HABITUDE PRISE SERA TRÈS DIFFICILE À FAIRE**

**CESSER** (c'est choux un petit chiot de 5 kg sur vos genoux sur le canapé... mais quand il fera 35 kg et qu'il viendra de faire une super ballade dans la boue, ça risque d'être moins choux !)

- L'alimentation :

Les repas doivent être distribués à heures à peu près fixes, à raison de 3 repas par jour (dose recommandée à fractionner en 3) jusqu'à l'âge de 4 mois puis 2 repas par jour. Il est préférable de dissocier l'alimentation du chien de la vôtre.

Ce qu'il faut faire :

- Le chien doit manger après vous ou au moins 3h avant de façon à ce qu'il ne croit pas qu'il a le privilège de manger en premier.
- Laissez la gamelle un temps limité, par exemple 15min de façon à apprendre à votre chien à manger ce que vous lui proposez quand vous le lui proposerez, s'il n'a pas fini, tant pis, retirez la gamelle jusqu'au prochain repas (un chien ne se laissera JAMAIS mourir de faim, lorsqu'il aura faim, il mangera ce qu'on lui propose).
- Si votre chien boude sa nourriture, réhydratez-la avec un peu de d'eau tiède

Ce qu'il faut éviter de faire :

Évitez de rajouter des extras (poulet, jambon, pain, lait) s'il n'accepte pas les croquettes dans un premier temps : il va s'y habituer, et il sera très très difficile de lui faire perdre cette habitude : comme expliqué plus tôt, lorsque votre chien aura faim, il mangera ce qu'on lui propose !

- Le point de la distribution des restes de table a déjà été évoqué à titre d'exemple dans le préambule, mais ne donnez pas lorsque **VOUS ETES EN TRAIN DE MANGER (Cf plus haut)**
- Regarder votre chien manger ou le nourrir à la main : en le regardant manger, vous lui donnez une prérogative de dominant.

**QUOI QU'IL EN SOIT, VOTRE CHIEN NE SE LAISSERA PAS MOURIR DE FAIM ! Il finira par manger ses croquettes lorsqu'il aura faim !**

Deux gamelles de taille adaptée seront nécessaires : une pour la nourriture et une pour l'eau. Veillez à ce que le chien ait toujours de l'eau fraîche à disposition et que les gamelles soient toujours propres.

- L'attachement et le détachement :

La mère chien noue avec sa progéniture un lien d'attachement dès la naissance. Ce lien est indispensable pour le bon développement psychomoteur du chiot mais il ne doit pas persister au-delà de l'âge de 5 à 6 mois. Dès son adoption dans votre famille, s'il a moins de 6 mois, le chiot renoue un lien d'attachement privilégié avec une personne du foyer qui remplacera sa mère et qui lui apportera chaleur et réconfort. Il cherchera à être toujours le plus près possible d'elle et sera apaisé en sa présence. En l'absence de cette personne, il a tendance à gémir. Il est primordial que ce nouveau lien d'attachement se noue pour que le chiot parte à la découverte de son nouveau monde. Cet attachement ne doit cependant pas être le prétexte de certaines erreurs : "il gémit parce qu'il a besoin d'être avec moi, donc je le fais dormir avec moi dans mon lit, ou je le fais monter sur le canapé lorsque je regarde la tv, ou je le laisse venir avec moi dans la salle de bain lorsque je prends ma douche parce qu'il est triste sans moi... ) : **PLUS VOUS FAVORISEZ CET**

**ATTACHEMENT ET VOUS LE RENFORCEZ, PLUS IL SERA DIFFICILE DE PROCEDER AU DETACHEMENT (cf infra) :** Il s'agit donc de trouver un juste milieu, pas forcément évident : il a besoin de votre contact (à votre initiative, cf préambule), mais il ne faut pas en faire trop non plus.

Vers 4 mois (équivalent en âge humain à 7-8 ans), il doit se produire un détachement affectif. L'attachement exclusif à la mère ou à la personne qu'il a choisie en arrivant dans le foyer doit faire place à un attachement au groupe social, qui lui sera indispensable pour le reste de sa vie. Le chien devient autonome. Pour ce faire, il y a quelques règles à respecter.

### Ce qu'il faut faire (dès le début)

- Le mettre sur son lieu de couchage seul plusieurs fois par jour même quand vous êtes à la maison.
- L'envoyer se coucher dans son panier dès qu'il vous suit de façon insistante dans la maison.
- Tous les contacts doivent être à l'initiative des maîtres : appelez souvent votre chien pour une caresse même s'il n'en demande pas puis renvoyez-le se coucher à la fin de la caresse. A contrario, ne répondez pas à ses sollicitations : quand il vient se frotter contre vous, renvoyez-le dans son panier et rappelez-le 2 minutes plus tard pour le caresser
- Avant votre départ de la maison, que ce soit pour 10 minutes et pour 3 heures, ignorez-le, ne lui parlez plus, ne lui portez aucune attention.
- A votre retour, ignorez ses manifestations de joie car ce sont des décharges émotionnelles qu'il doit apprendre à maîtriser, , envoyez-le se coucher à sa place, et appelez-le pour le caresser ou pour sortir ou pour jouer dès qu'il se calme.

### Ce qu'il faut éviter de faire

- Lui dire longuement « au revoir » quand vous vous apprêtez à partir : Ritualiser le départ ne fera qu'augmenter son stress, par anticipation du départ : lui expliquer pendant 10 minutes : “maman va revenir tu vas rester très sage ne t'inquiète pas” ne sert pas à grand-chose : en effet, il ne comprend pas les mots que vous employez, et cela risque de renforcer son anxiété.
- Accepter et renforcer la fête du retour.
- Le laisser vous suivre partout quand vous circulez dans la maison.

Plus vous lui apprendrez tôt à savoir rester seul, plus votre chien sera équilibré car bien dans sa tête et libéré de toute angoisse à chacun de vos départs. Il échappera ainsi à une pathologie comportementale de plus en plus fréquente : l'anxiété de séparation qui amène le chien à hurler, à détruire ou à souiller votre maison en votre absence.

## L' EDUCATION :

### A SAVOIR:

Il y a 4 phases importantes dans le développement du chiot, celle qui nous intéresse est la 4ième :

La Période de socialisation : De 21 jours à 3 mois – le chiot a pris possession de tous ses sens et s'en va découvrir le monde, il explore, joue avec sa fratrie, jappe... C'est pendant cette période que tout va se jouer. Le chien est en phase D'ATTRACTION, c'est-à-dire que ce qui l'entoure l'attire plus que ne lui fait peur, il faut donc lui montrer, lui faire découvrir, des personnes de tailles différentes, de couleurs différentes, des enfants, des chats, des voitures, la foule, le bruit de l'aspirateur... Emmener le par exemple à la sortie d'une école pour qu'il voit plein de monde, entende des cris d'enfants...

Si votre compagnon n'a pas l'occasion de découvrir tout ceci, après 3 mois il rentre en phase D'AVERSION, c'est-à-dire que, contrairement à la phase d'attraction, tout ce qui est inconnu va lui faire peur et il est assez difficile de renverser cette aversion.



Il est important de ne pas retirer un chiot de sa mère avant l'âge de 2 mois car celle-ci n'aura pas terminé de l'éduquer, notamment en ce qui concerne la morsure inhibée et les autocontrôles

- Communication et apprentissage

Votre chien ne va "apprendre" que quelques mots : son vocabulaire est assez limité, et il est important que tous les membres du foyer adoptent le même vocabulaire. Par ailleurs, l'intonation et l'attitude corporelle sont très importants lorsqu'on communique avec son chien.

### Ce qu'il faut faire :

- Utiliser des ordres simples, avec des mots clairs et concis : **NON, ASSIS, COUCHÉ, C'EST BIEN, ÇA SUFFIT, PAS BOUGÉ, AU PIED, AU PANIER...** ce ne sont que des exemples et cela peut varier, d'une famille à l'autre, mais ce qui est très important, c'est que TOUT LE MONDE UTILISE LE MÊME ORDRE AU SEIN DU FOYER... Si un membre dit TA PLACE et l'autre dit AU PANIER pour inviter le chien à aller se coucher sur son tapis, le chien risque d'être perdu et ne plus comprendre ce qu'on lui demande.
- Associer le geste à la parole : par exemple dans l'apprentissage du ASSIS, une petite pression peut être réalisée sur les fesses du chien pour l'inciter à s'asseoir.
- Au début, chaque moment partagé avec le chien, dès que vous êtes avec lui à la maison, doit être prétexte à apprentissage : c'est tout au long de la journée que vous allez apprendre à communiquer à votre chien et lui apprendre à vous comprendre. Par exemple, lorsque vous jouez avec lui dans le jardin, vous pouvez régulièrement le rappeler par son prénom, et le récompenser (friandise ou caresse) dès qu'il revient ! OU bien lorsque vous êtes dans la maison, vous pouvez régulièrement lui demander de s'asseoir, même s'il n'y a pas nécessité qu'il s'assoie ,et le récompenser dès qu'il s'est assis.... Plus les sollicitations seront régulières, mieux ça sera !

### Ce qu'il faut éviter de faire

- Réaliser de lourdes séances d'apprentissage le WE (2-3 heures d'affilée), risquant de saouler votre chien, et ne plus rien faire durant la semaine (parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on travaille, qu'on a les enfants, qu'on doit faire les courses.....) : l'éducation et l'apprentissage d'un chien est un travail du quotidien, de régularité et de persévérance ...)
  - Être incohérent : Une personne de la famille dit noir l'autre dit blanc : par exemple (même si cela a déjà été évoqué plus haut !) si une personne autorise le canapé et l'autre pas, cela va générer de l'incompréhension et de l'anxiété chez votre chien. **TOUT LE MONDE DOIT ADOPTER LA MÊME LIGNE DE CONDUITE**
- Récompense et punition :

#### La récompense :

Dès que votre chien fait correctement ce que vous lui demandez ( aller à son tapis, s'asseoir, revenir au rappel....), il doit être récompensé : soit par la voix et une caresse, soit avec une récompense alimentaire : d'abord systématiquement (afin de faire du **RENFORCEMENT POSITIF**), puis une fois sur deux, puis une fois sur trois, puis de manière aléatoire : La récompense sert à ce que votre chien voit un intérêt à faire ce que vous lui demandez : Mettez vous à la place de votre chien : Il est en train de jouer avec un lézard au fond du jardin, et vous l'appellez pour qu'il revienne : il n'a aucun intérêt à revenir, son copain le lézard est bien plus intéressant que vous..... Sauf s'il sait qu'en revenant, il sera récompensé (par une caresse ou une friandise alimentaire... pour la plupart des chiens, la friandise est nettement plus alléchante !) : Et non, si le chien revient, **CA N'EST PAS POUR VOUS FAIRE PLAISIR ! IL REVIENT PARCE QU'IL Y VOIT UN INTERÊT PERSONNEL !**

#### La punition :

**Elle** doit avoir lieu en **début de séquence négative** : vous devez prendre votre chien sur le fait pour le gronder.

### Ce qu'il faut faire :

- Dès que votre chiot commence à faire une action non souhaitée (Se mettre en position pour faire pipi dans un endroit inapproprié, se dresser sur ses pattes pour piquer le morceau de fromage sur la table, grogner sur quelqu'un ...), vous devez lui dire un NON ferme et définitif, le prendre par la peau du coup et lui faire un petit geste désagréable (petite pichenette sur le museau par exemple).
- Dès que votre chien s'est arrêté de faire ce pour quoi vous le grondez, n'oubliez pas de le féliciter (par exemple : il se dresse sur ses pattes pour chiper le morceau de fromage sur la table, vous lui dites NON, et il redescend, n'oubliez pas de le féliciter une fois qu'il est redescendu...

### Ce qu'il faut éviter de faire

- Gronder votre chien à distance dans le temps de la bêtise : SI vous rentrez après une absence et que vous constatez le méfait, il sera inutile de gronder votre chien : il ne fait pas le lien temporel entre votre réaction et sa bêtise (bêtise qui est une notion très relative et très humaine.... ) : **ET NON** : le fait de baisser les oreilles lorsque vous rentrez ne signifie **PAS QU'IL SAIT QU'IL A FAIT UNE BÊTISE** car :
- 1- la notion de bêtise est très relative (déchiqueter un coussin pour lui s'apparente à un jeu ou à une occupation pour tromper l'ennui ou l'anxiété, mais pas à une bêtise : il ne se venge pas – là encore la notion de vengeance est un concept humain, mais pas canin).
  - 2- Et s'il baisse les oreilles c'est uniquement parce qu'il décrypte votre attitude en rentrant et en constatant l'« assassinat » de votre coussin préféré : vous êtes en colère, il le sent car il est très doué pour lire votre attitude corporelle, mais il ne fait absolument pas le lien avec cette chose hyper rigolote qu'il a faite une heure auparavant (là encore, la notion d'heure est assez abstraite pour le chien !), consistant à dépiapter le coussin !

- Lui tenir des grands discours en constatant le méfait « Médor ce n'est pas bien ce que tu as fait, tu as dépiauté mon coussin préféré que me tante m'avait offert pour mon anniversaire et qui allait très bien avec le tissu du canapé, je suis déçu(e) de ton attitude »..... Bof... en langage chien ça peut donner « Médor (car il reconnaît son prénom) blablalblablalblalblinblinblinblanblanblanblébléblublu etc..... »
- Quelques exemples concrets (liste non exhaustive).

**La marche en laisse** : dès le plus jeune âge, il faut habituer le chiot au port du collier puis à la laisse. La marche en laisse doit commencer à la maison, plusieurs fois par jour sur une courte durée. Si le chien tire, exercez de petites tractions brèves sur la laisse en attirant l'attention de votre chien par de petits claquements de langue. La laisse physique se double ainsi d'un lien vocal. Dès qu'il suit la direction de la laisse, même sur quelques mètres, récompensez-le (voix, caresse ou friandise). La laisse doit toujours être détendue. Si le chien tire, donnez-lui l'ordre de venir au pied (utilisez toujours le même ordre), ramenez-le sèchement à votre pied et détendez immédiatement la laisse. Dès que le chien fait quelques mètres sans tirer, récompensez-le chaleureusement. Ne jamais le taper avec la laisse, elle doit être signe de joie et de sortie, non de punition.

Si votre chien vous semble anormalement apeuré lors de ses premières sorties, ne le caressez, ne le prenez pas dans vos bras pour le rassurer : il va percevoir cela comme une récompense et un renforcement positif de son attitude : en langage chien cela peut donner : «il/elle me récompense, j'ai donc raison d'avoir peur »...

Prenez un air indifférent et changez lui les idées en l'entraînant dans un jeu (balle, bâton....)

### Acquisition de la morsure inhibée :

Naturellement, le chiot n'a pas conscience, avant 4 semaines, que ses dents font mal quand il les plante dans votre main. S'il s'agit d'un congénère celui-ci crie et/ou mord en retour ou la mère intervient pour sanctionner le mordeur, ce qui entraîne l'arrêt de la morsure. Ainsi le chiot apprend à se modérer, à maîtriser son impulsivité et à se contrôler. L'acquisition de la morsure inhibée doit être réalisée vers 6 semaines. Lors de l'adoption, en général vers 2 mois, si le chiot continue à mordre, c'est que la mère n'a pas été suffisamment présente avec ses chiots pendant le mois qui a précédé. Si vous laissez la situation telle qu'elle, vous risquez d'avoir un chien qui continuera à mordre, sans contrôler le serrage de sa mâchoire : cela peut poser problème.

En cas de mordillement, intimisez-lui l'ordre d'arrêter, par un NON catégorique, au besoin pincez lui la babine. Evitez d'exciter le chiot par des jeux de mordant et de tiraillement, qui n'ont d'autres effets que de lui apprendre à serrer et à grogner de plus en plus fort.

### La propreté

L'apprentissage de la propreté doit commencer dès l'arrivée du chiot dans sa nouvelle famille. Elle doit être acquise dès l'âge de 6 mois.

### Ce qu'il faut faire

- Sortir le chiot après les repas, après une phase de sommeil et après une phase de jeu avec la personne préférée du chiot (il la suivra plus facilement). Une sortie nocturne pourra également s'avérer nécessaire, que vous décallerez progressivement (d'abord 4h du matin, puis 4h30, puis 5h etc...).
- Choisir un endroit calme, riche en odeur, éloignée de l'endroit où il dort et mange toujours au même endroit dans un premier temps ; par la suite varier les substrats (béton, herbe, terre).
- Récompenser chaleureusement en fin de miction ou de défécation soit par la voix et/ou avec des caresses systématiquement au début puis aléatoirement par la suite.

### Ce qu'il ne faut pas faire

- Eviter de rentrer le chiot immédiatement après qu'il se soit soulagé : il comprendrait que la sortie ou la promenade se termine dès qu'il a fait ses besoins et quand il n'aura pas envie de rentrer il tardera à se soulager
- Matérialiser une zone d'élimination dans la maison par une serpillière ou un journal : le chiot apprend à faire à cet endroit, donc dans la maison : Or , c'est précisément ce que l'on souhaite éviter : on veut qu'il fasse dehors.

- Sanctionner à posteriori : la punition doit intervenir dès que le chien flaire le sol ou dès qu'il s'accroupit, avant la 1<sup>er</sup> goutte de pipi. A ce moment précis, vous prenez le chiot par la peau du cou en disant un NON catégorique et vous l'emmenez dehors rapidement. Une fois dehors, vous lui parlez doucement pour l'inciter à terminer ses besoins : une fois qu'il a terminé dehors, vous le félicitez.
- Montrer du doigt et mettre le nez dedans : sentir ses excréments est un comportement normal pour un chiot (un chien dans la rue passe son temps à flairer les déjections des autres contre les poteaux ... ça n'est donc pas une punition que de lui mettre le nez dedans !)
- Nettoyer devant le chiot : faire des gestes rapides accroupi devant lui est considéré comme une incitation au jeu
- Nettoyer avec de l'eau de javel : les produits ammoniacés attirent le chiot (l'urine des chiots est stérile !)
- Le laisser seul dehors pour qu'il fasse ses besoins : vous ne serez pas en mesure de le récompenser.
- Frapper le chien, cette méthode peut entraîner une peur envers vous voir de l'agressivité



## LA VACCINATION :

**LE BUT :** Eviter l'apparition de maladies infectieuses contagieuses.

**LES CONDITIONS :** La vaccination se pratique sur un animal en bonne santé et vermifugé car la réponse immunitaire est meilleure sur un animal non parasité. La vaccination s'effectue sur des chiots âgés au minimum de 8 semaines (quelques cas particuliers de vaccination plus précoces peuvent se rencontrer en élevage).

### PROTOCOLE

Classiquement, la primo vaccination consiste en 3 injections, réalisées chacune à 4 semaine d'intervalle :

8 semaines : CHPPIL4  
 12 semaines : CHPPIL4  
 16 semaines : CHPPI

D'autres vaccins pourraient être nécessaires (toux de chenil, rage), mais quoi qu'il en soit, les protocoles de vaccinations sont définis au cas par cas en fonction de plusieurs critères, que le vétérinaire évoquera avec vous au moment de la visite.

Des rappels annuels sont nécessaires pour certaines valences (leptospirose, toux de chenil), mais pas nécessaires pour d'autres (Carré, hépatite, parvovirose). Là encore, c'est le vétérinaire qui jugera de la nécessité de vacciner, et avec quelles valences, au cours de la visite annuelle.



Voici un tableau récapitulatif des principales maladies contre lesquelles il est possible de vacciner.

Maladie	Symptômes	Zoonose*
Maladie de carré	Très présente en France, elle touche les animaux de tous âges. Elle provoque de la <b>fièvre, des problèmes digestifs, une atteinte respiratoire, l'apparition de pustules et des troubles nerveux</b> . Le pronostic est réservé : la mortalité atteint 50 % et la moitié de ceux qui guérissent présente des séquelles nerveuses.	NON
Parvovirose	Elle est due à un virus très résistant. Après 3 à 4 jours d'incubation, les symptômes apparaissent brutalement : <b>anorexie, prostration puis vomissement et diarrhée hémorragique</b> . La mortalité est plus importante chez les chiots âgés de 6 à 12 semaines. Vaccination dès 6 semaines.	NON
Hépatite De Rubarth	Elle concerne principalement les chiots entre 3 et 12 mois. Les chiens atteints présentent au <b>début apathie et hyperthermie</b> . Puis apparaissent des symptômes digestifs ( <b>diarrhée, vomissement, anorexie, augmentation de la soif</b> ). On observe également des signes oculaires : <b>conjonctivite, opacification de la cornée</b> . Le chien guérit généralement en 5 à 10 jours. L'Hépatite de Rubarth est de plus en plus rare en France du fait d'une vaccination efficace.	NON
Leptospirose	Elle touche de nombreuses espèces avec une prédilection pour les zones humides. Elle est véhiculée par les rongeurs qui sont des porteurs sains. La transmission se fait par morsure, léchage ou contact avec les sécrétions des animaux malades. Elle provoque <b>abattement, prostration, anorexie, hyper puis hypothermie, douleur abdominale</b> . S'en suit une <b>gastro-entérite hémorragique</b> , associée à une coloration jaune des muqueuses (ictère). La mort survient après une phase de coma en 48h à 15 jours. <b><u>La leptospirose est transmissible à l'homme.</u></b>	OUI
Toux de chenil	C'est une maladie respiratoire très contagieuse que l'on rencontre plus particulièrement dans les collectivités canines : élevages, chenils, refuges, expositions.. Un programme de vaccination adapté aux chiens « à risque » peut être mis en place.	NON
Rage	<b><u>Elle est transmissible à l'homme et mortelle</u></b> si un traitement médical n'est pas instauré le plus rapidement possible. Le virus est inoculé lors d'une morsure ou griffure. Au début de la maladie, le chien présente des <b>troubles du caractère</b> : il devient inquiet, est sans cesse en activité, alternant phase d'apathie et d'excitation. Puis apparaissent des troubles généraux, notamment une gêne à la mastication des aliments. Le chien devient furieux, s'attaque à tout ce qui l'entoure. Puis une paralysie s'installe évoluant inexorablement vers la mort.	OUI
Piroplasmose	Elle sévit dans les régions chaudes et tempérées, pendant les saisons d'activités des tiques. En prenant son repas de sang sur le chien, la tique injecte les parasites dans le sang. Les symptômes apparaissent 2 jours à 2 semaines après: <b>hyperthermie, abattement, anorexie, anémie</b> . Les <b>urines sont teintées de sang</b> . Les signes cliniques sont parfois atypiques : troubles nerveux, digestifs, respiratoires, cutanés, oculaires. La prévention contre les tiques reste le moyen de lutte le plus efficace contre la piroplasmose. Il existe un vaccin, dont l'efficacité se situe aux alentours de 70%. Le protocole vaccinal comprend 2 injections à 3 semaines d'intervalle puis un rappel annuel.	NON

\* Zoonose : le terme zoonose signifie que la maladie est transmissible de l'animal à l'homme

## LA VERMIFUGATION ET LE TRAITEMENT ANTI PARASITAIRE EXTERNE:

### La vermifugation :

Les Chiots doivent (dans l'idéal) être vermifugés de façon préventive :

- Tous les 15 jours jusqu'à l'âge de 2 mois
- Tous les mois jusqu'à l'âge de 6 mois : en effet : le système de défense du chiot est moins efficace, et il a plus tendance à mâchouiller des cochonneries dehors, donc de se contaminer en ingérant des larves ou œufs de parasites.
- A 9 mois, à 12 mois puis 4 à 6 fois par an selon les conditions de vie du chien. Un chien qui vit dehors en contact avec d'autres animaux et des enfants doit être vermifugé plus régulièrement qu'un chien vivant en appartement qui ne fréquente pas d'autres congénères
- Les vers intestinaux des chiens peuvent se transmettre aux humains, et particulièrement aux enfants qui y sont sensibles.

Si vous avez une femelle gestante à la maison il est important pour la santé des chiots de la vermifuger 15 jours après la saillie puis 15 jours avant la date de mise bas présumée puis 15 jours après la mise bas en même tant que les chiots.



IDEES RECUES : Les animaux qui mangent de l'herbe ne se purgent pas, bien au contraire ils risquent de s'infester en ingérant de l'herbe qui peut être contaminée

### Le traitement antiparasitaire externe : (Tiques, puces, poux, moustiques...)

Les chiots peuvent être traités à partir de 2/3 semaines mais attention, les animaux de moins de 2 mois et moins de 2 kg doivent être traités avec des produits spécifiques, c'est à partir de 8 semaines que l'utilisation de l'aplupart des spécialités est possible.

De nombreuses spécialités sont disponibles, sous forme de colliers, comprimés ou pipettes (tous les produits ne se valent pas... attention !)

La durée d'efficacité varie en fonction de la spécialité employée. Demander conseil à votre vétérinaire.

Quoi qu'il en soit, les traitements antiparasitaires doivent être continus TOUTE L'ANNEE, ne pas s'arrêter l'hiver, sans quoi, une explosion du parasitisme pourrait se produire au printemps.

Une lutte efficace et régulière contre les parasites externe permettra d'éviter de nombreux problèmes : dermatites allergiques aux puces se traduisant par de graves problèmes de peau, maladies vectorielles transmises par les tiques comme la piroplasmose ou la maladie de Lyme... ) ...

En terme de pipettes ou colliers, nous pouvons vous conseiller ces produits :

<https://www.vetoavenue.fr/73943-advantix-chien-moyen-de-10-a-25-kg.html>

<https://www.vetoavenue.fr/77185-seresto-collier-pt-chien.html>

D'autres produits, sous forme de comprimés, peuvent être utilisés, mais ne sont pas disponible en libre service : ils sont soumis à une prescription que votre vétérinaire est habilité à faire.

Les animaux vivant dans le sud, sur le pourtour du bassin méditerranéen, ou y allant en vacances devront être traités contre LES MOUSTIQUES (phlébotomes) car ceux-ci peuvent transmettre de graves maladies (leishmaniose



ATTENTION AUX CONTRES INDICATIONS : Veuillez bien à utiliser un produit pour chien !!!!

### L'HYGIENE AU QUOTIDIEN :

Vous devez habituer dès le début à toutes sortes de manipulations pour votre chien : manipulation des oreilles, des membres, le faire se coucher sur le côté en le faisant basculer, ouverture de la gueule.....

Il s'agit de rendre ces gestes, qui vous permettront de lui prodiguer toute sorte de soins d'entretien ou médicaux, normaux, sans que cela paraisse une contrainte pour votre chien, et sans que cela devienne un moment stressant pour lui et pour vous. En aucun cas il ne faut avoir à se battre pour quelque manipulation que ça soit, auquel cas le chien va se braquer, risque de se montrer agressif, et cela peut devenir dangereux pour lui et pour vous.

Pour l'habituer , il existe des techniques de « medical training » : allez faire un tour par là :

<https://www.zenovet.com/>

L'idée est de réaliser ces manipulations en les associant à quelque chose de positif, afin que votre chien ne prenne pas ça comme une contrainte, mais comme quelque chose de plutôt agréable (une récompense alimentaire par exemple).

### Le pelage :

Quelle que soit la nature du pelage, les poils poussent, meurent et se renouvellent.

La plupart des chiens mue toute l'année avec un pic deux fois par an (printemps et automne). Chez les chiens vivant en intérieur, moins sujets aux variations de température, d'éclairement et d'humidité, on observe une chute plus fréquente.

En entretien un brossage 2 à 3 fois par semaine suffit : il permet d'enlever le poil mort ; en période de mue, un étrillage s'impose.

Au cas où un lavage s'avère nécessaire, utiliser un shampoing pour chien. Les shampoings « humains » même les shampoings doux pour Bébé ne sont pas adaptés à la peau du chien dont le pH se situe entre 5.5 et 7.2 (celui de la peau de l'homme est plus acide (5.5)). La fréquence des bains varie selon le mode de vie du chien, mais il est néfaste de laver votre compagnon trop fréquemment : les shampoings enlèvent la substance huileuse qui recouvre le pelage pour le protéger du froid et de la pluie.

Quelques exemples de produits utilisables en entretien :

<https://www.vetoavenue.fr/78869-douxo-s3-care-shampooing.html>

<https://www.vetoavenue.fr/76245-shampoing-physiologique.html>

En cas de pathologie cutanée (parasites, séborrhée, démangeaisons, pyodermite, pellicules) votre vétérinaire conseillera un shampoing traitant adapté au problème de votre chien.

## Les yeux et les oreilles :

Les **oreilles** et les **yeux** doivent faire l'objet d'une attention particulière :

Les yeux doivent être nettoyés régulièrement avec du sérum physiologique ou une lotion oculaire pour chien.


[https://www.vetoavenue.fr/75489-lacrynet.html?search\\_query=lacrynet&results=1](https://www.vetoavenue.fr/75489-lacrynet.html?search_query=lacrynet&results=1)

Après avoir instillé quelques gouttes dans l'œil de votre chien, recueillir les impuretés en passant une compresse du coin interne de l'œil vers le coin externe.

Préventivement, on doit habituer le chiot aux soins des oreilles : épilation, application de produit d'entretien du conduit auditif.

Utilisez un nettoyant physiologique, ( <https://www.vetoavenue.fr/74809-douxo-lotion-auriculaire.html>) instillez une giclée dans l'oreille du chien puis massez la base de l'oreille, laissez le chien se secouer puis à l'aide d'une compresse enlevez les saletés qui se trouvent à l'entrée du conduit auditif et sur le pavillon de l'oreille. (cf. dessin)

Après chaque sortie, une inspection soigneuse des conduits auditifs est nécessaire pour rechercher la présence éventuelle d'épillet.



## La bouche :

Tout comme chez l'humain, l'hygiène bucco-dentaire est très importante.

VOTRE CHIEN AURA AUTOMATIQUEMENT DU TARTRE (même si vous donnez des lamelles à mâcher..... prenez notre exemple à nous : nous nous lavons les dents 2 à 3 fois par jour et nous avons quand même besoin d'aller nous faire détartrer !)

La méthode la plus efficace pour votre chien reste le brossage des dents. Même s'il n'est pas tout à fait nécessaire avant 7 mois (les dents de lait tombent entre 4 et 7 mois), il est important d'habituer votre chien assez tôt à ces manipulations (cf plus haut !)

Des produits spécifiques, avec doigtier (étant la solution la mieux adaptée pour les chiens) doivent être utilisés.

<https://www.vetoavenue.fr/74171-bucogel.html>

Bien sûr, vous ne pourrez pas brosser les dents de votre chien après chaque repas (quoi que !!??), donc des solutions alternatives peuvent venir en complément (lamelles à mâcher, poudre à mettre dans l'aliment... ) . Demandez conseil à votre vétérinaire.

<https://www.vetoavenue.fr/77562-veggiedent-fresh.html>

Malgré vos bons soins, il y a de forts risques que du tartre s'installe, et nécessite un détartrage : cependant, si vous prenez bien soin des dents de votre compagnon, les détartrages seront plus tardifs et espacés.

Enfin, tous les chiens ne sont pas égaux face au tartre, et les petites races ont bien souvent tendance à y être plus sensibles.

## L'ALIMENTATION :

Une alimentation de qualité permettra une croissance harmonieuse, une prévention des problèmes pathologiques et une bonne santé.

Les besoins nutritionnels du chien sont très différents de ceux des humains.

En terme de régime alimentaire, l'homme est un omnivore, le chien un animal à prédominance carnivore. Les fonctions digestives diffèrent également. C'est pourquoi nourrir votre chien « comme vous » peut engendrer des carences ou des excès et conduire à des pathologies plus ou moins graves.

Ces dernières années, les fabricants d'aliments ont mis au point des gammes d'aliment d'excellente qualité, adaptées aux besoins nutritionnels des chiens en fonction de leur race, de leur âge, du statut physiologique et des maladies dont peut souffrir votre animal. Ces aliments, parfaitement équilibrés, ne nécessitent aucune supplémentation. Ils se présentent sous forme de boîte (aliment humide) ou de croquettes (aliment sec). Contrairement à une idée reçue, les aliments humides (communément appelés « boîtes », ne sont pas plus gras : au contraire, ils sont composés à 75% d'eau.

Concernant les marques à privilégier, il est assez difficile de s'y retrouver tant l'offre est importante :

Les gammes s'étendent du premier prix de supermarché, aux gammes premiums que vous pouvez retrouver en animalerie ou chez les vétérinaire.

- Globalement les aliments trouvés en supermarchés ne remplissent pas des critères de qualités stricts, et , afin de tirer les prix vers le bas, les matières premières protéiques sont souvent de qualité médiocre : cela peut engendrer des problèmes de digestion ou de pelage.
- Concernant les gammes trouvées en animalerie, il y a de tout : de la qualité, et des choses moins bonnes : la grande différence de qualité se fait selon plusieurs critères, mais globalement, la qualité est assez bien corrélée au prix : Il est difficile de trouver des croquettes qualitatives à moins de 3.5euros /kg pour les grands conditionnements (10 à 15kg), ou 6-7 euros/kg pour les plus petits conditionnements (3.5-5kg). Et cela vaut pour les aliments dits « physiologiques » (c'est-à-dire pour animal ne présentant pas de problème de santé particulier, dans ce cas là, une alimentation médicalisée, plus coûteuse, pourra être nécessaire).
- Enfin, les gammes sélectionnées par les vétérinaires, qui le sont selon différents critères : le premier critère de choix est le fait que **seuls 3 fabricants de croquettes possèdent un laboratoire de recherche en nutrition animale : il s'agit de Proplan, Hill's et Royal Canin**. Pour notre part, nous avons également décidé de travailler avec deux autres laboratoires : Virbac, qui est à la base un laboratoire pharmaceutique, donc qui possède un pôle recherche, et Tonivet, qui est un fabricant local, basé en occitanie, utilisant des matières premières françaises à 90 % (<https://www.tonivet.fr>). Il n'y a pas forcément de différence de prix

significative entre les aliments retrouvés en animalerie et chez votre vétérinaire (à qualité équivalente bien entendu).

Quoi qu'il en soit, quelques règles sont à respecter :

- Si vous utilisez un aliment humide, donnez la même marque que la croquette choisie (c'est trop dommage de donner des croquettes premium à votre chien et de lui prendre les boîtes du supermarché, dont les qualités de matières premières sont assez médiocres).
- Distribuez un aliment adapté au statut physiologique de votre chien (Puppy ou Junior, Adulte – stérilisé ou non -, senior ou mature).
- Concernant les aspects et le mode de distribution, nous en avons déjà parlé
- Il est important de mesurer la quantité à donner à votre chien : En général, les indications données au dos des paquets sont cohérentes.

Néanmoins, vous pouvez opter pour la ration ménagère en l'adaptant aux besoins nutritionnels du chien. Il existe une vétérinaire spécialisée en nutrition animale, qui propose de calculer des rations ménagères pour votre compagnon.

<https://cuisine-a-crocs.com/fr/>

Enfin, certains propriétaires se demandent s'il faut varier l'alimentation de leur chien. **NON** : dans la nature, les animaux varient très peu leur alimentation. Le chien n'a pas besoin de variété et peut sans inconvénient consommer le même aliment toute sa vie (le chien possède beaucoup moins de papilles gustatives que l'Homme).

Attention : Tout changement d'aliment doit être fait en réalisant une transition alimentaire sur 5-6 jours, afin de ne pas perturber l'équilibre digestif de votre chien.



## LA REPRODUCTION ET STERILISATION:

La puberté chez les chiens et les chiennes dépend leur format:

- chiens de petite race (York, bichon..) : Entre 6 et 9 mois
- chiens de race moyenne (Epagneul, cocker..) : Entre 10 et 12 mois
- chiens de grande race (Labrador, bouvier bernois..) : Entre 12 et 14 mois
- chien de race géante (Rottweiler, Dogue allemand..) : Entre 14 et 18 mois

La femelle a normalement (dans 80% des cas), ses *chaleurs* 2 fois par an pendant une durée d'environ 3 semaines.

Pendant cette période, la chienne présente des *saignements vulvaires*, sa vulve est gonflée, elle attire les mâles.

La période optimale d'accouplement se situe entre le 10<sup>e</sup> et le 15<sup>e</sup> jour des chaleurs. Lors de l'accouplement, le mâle et la femelle vont rester « collés » 10 à 20 minutes ; il ne faut surtout pas chercher à les séparer à ce moment là sous peine de leur infliger de graves blessures.

Le cycle se poursuit par 2 mois de gestation ou de pseudo gestation puis le repos sexuel jusqu'à ses prochaines chaleurs.

On conseille vivement de ne pas mettre une femelle à la reproduction avant ses 3<sup>ème</sup> chaleurs et après ses 7 ans pour les petites races ou ses 5 ans pour les autres.

Chez les chiennes non destinées à la reproduction, la stérilisation chirurgicale (ovariectomie ou ovario-hystérectomie) avant les premières chaleurs, éventuellement entre les 1<sup>ères</sup> et les 2<sup>èmes</sup> chaleurs, est la solution idéale. Les risques de tumeur mammaire et d'infection de l'utérus seront ainsi considérablement diminués. Les effets secondaires, comme l'incontinence urinaire de castration ou la prise de poids, sont rares et maîtrisables.

Moins radicale, la contraception hormonale par injection ou comprimé doit rester une solution exceptionnelle et provisoire, car elle présente de nombreux risques d'effets secondaires (infection de l'utérus, tumeurs utérines... ) Vous pouvez également laisser les chaleurs se dérouler naturellement, avec les désagréments que cela comporte : perte de sang pendant 3 semaines, horde de chiens mâles devant ou dans la propriété.



### SITUATIONS D'URGENCE :

Un chiot est vif, dissipé, il répond mal aux ordres, il mange tout et n'importe quoi. Mettez hors de sa portée les médicaments humains, le chocolat, les produits de nettoyage, les plantes d'intérieur, les fils électriques, les ficelles, les objets tranchants, les produits de jardin : engrais, pesticides, insecticides, herbicides et raticides. Les accidents arrivent très rapidement.

Voici un aperçu des situations d'urgence les plus courantes et les gestes d'urgence à effectuer qui peuvent sauver votre animal, avant de l'emmener chez votre vétérinaire.

Plaie externe	Nettoyez à grande eau, désinfectez et consultez votre vétérinaire si besoin
Traumatisme (accident, chute, morsure)	Evitez de manipuler le chien Comprimez le point de saignement Dégagez les voies respiratoires si elles sont encombrées de saletés, de caillots de sang, de salive Consultez votre vétérinaire même si le chien semble indemne
Piqûre d'insecte	Retirez le dard avec une pince à épiler, appliquez de la glace sur la zone et consultez votre vétérinaire si besoin (difficultés respiratoires, altération de l'état général... ) Attention aux chenilles processionnaires au printemps : en cas de suspicion, rinçage abondant de la bouche à grande eau, et consulter rapidement.
Intoxication	Consultez votre vétérinaire dans les plus bref délais Intoxication les plus courantes : tranquilisant pour humain, pesticide, raticide, anti-limaces, chocolat, antigel, automédication par le propriétaire : aspirine, paracétamol, chenilles, produits ménagers (lessive, javel), collier anti-parasitaire CNITV (Centre antipoison Vétérinaire): 04.78.87.10.40
Coup de chaleur	Douchez le chien à l'eau froide, ou immergez-le dans l'eau froide, mettez de la glace sur la tête, le ventre Emmenez-le d'urgence chez le vétérinaire
Diarrhée	Diète hydrique (rien à manger, eau fractionnées en petite quantité) pendant 24/48h, vermifugez, administrez des pansements intestinaux (smecta Etc... ) Si les symptômes persistent ou si l'état général est altéré, consultez votre vétérinaire
Vomissements	Ingestion d'herbe suivit de vomissement : comportement normal si pas trop fréquent Vomissement de bile, de mousse ou alimentaire : diète 24/48h, vermifuge, anti-vomitifs et pansements gastriques. Si les symptômes persistent ou si l'état général se dégrade, consultez votre vétérinaire Effort vain de vomissement : CONSULTEZ EN URGENCE (risque de dilatation-torsion de l'estomac)
Electrocution	Consultez votre vétérinaire

### TROUSSE A PHARMACIE :

Alcool, Eau oxygénée, Solution antiseptique (vétédine<sup>ND</sup> ou chlorhexivet<sup>ND</sup>)  
Pansement anti vomitif, anti-darrrhéique (Smecta ou Smectivet<sup>ND</sup>)  
Vermifuge polyvalent (Milbemax<sup>ND</sup>)  
Produits antipuces-antitiques (pipettes advantix<sup>nd</sup>,bravecto<sup>ND</sup>, collier Seresto<sup>nd</sup> )  
Produits de nettoyage des yeux et des oreilles  
Spray tannant pour les coussinets  
Pince à épiler  
Pince à tiques  
Ciseaux à bouts ronds  
Thermomètre  
Coton, Compresses stériles, Bandage, Elastoplaste



NE JAMAIS ADMINISTRER DE **PARACETAMOL** (Doliprane, Efferalgan, Dafalgan) À VOTRE ANIMAL SI VOUS PENSEZ QU'IL A MAL OU SI VOUS ESTIMEZ QU'IL A DE LA FIEVRE.

**LE PARACETAMOL EST TOXIQUE POUR LES CHIENS ET LES CHATS.**

**LE CHOCOLAT EST TRES TOXIQUE POUR CERTAINS CHIENS, UN SEUL CARRE POURRAIT LE TUER**



Ce document est destiné à apporter quelques réponses aux questions que vous vous posez. Il ne se veut en aucun cas exhaustif, et d'autres questions pourront vous venir en le lisant .

Toute l'équipe de la clinique vétérinaire de la Pointe se tient bien entendu à votre disposition pour de plus amples informations.

Bonne lecture,

Bon démarrage avec votre compagnon !